

**1. In quale distretto va eseguita la paracentesi?**

- a) Torace
- b) Arti inferiori
- c) Addome
- d) Nessuna delle precedenti

**2. L'iscrizione all'Ordine per un infermiere è:**

- a) Necessaria per esercitare la libera professione
- b) Indispensabile per essere assunti in strutture pubbliche
- c) Indispensabile per essere assunti in strutture private
- d) Tutte le precedenti

**3. La raccolta dell'urina all'interno di un contenitore sterile si utilizza per:**

- a) Un esame batteriologico
- b) Ogni qualvolta si deve fare un esame completo delle urine
- c) Per fare un sedimento delle urine
- d) Tutti e tre i motivi sopra descritti

**4. Lo pneumotorace spontaneo è costituito da presenza di:**

- a) Pus nella cavità pleurica
- b) Liquidi nelle cavità alveolari
- c) Aria nella cavità mediastinica
- d) Aria nella cavità pleurica

**5. Il paziente si definisce bradicardico quando:**

- a) La frequenza cardiaca è < 60 bpm
- b) La pressione arteriosa sistolica è < 90 mmHg
- c) La diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml
- d) Il polso si presenta aritmico

**6. La Disfagia determina:**

- a) Avversione per i cibi solidi
- b) Dolore post prandiale
- c) Difficoltà alla deglutizione
- d) Assunzioni di quantità eccessiva di liquidi

**7. Si definisce ritenzione urinaria:**

- a) Bruciore durante la minzione
- b) Produzione di urina < 200 ml nelle 24 ore
- c) Produzione di urina > 400 ml nelle 24 ore
- d) Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

**8. Dopo aver inserito un catetere di Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione:**

- a) Iniettare della soluzione fisiologica
- b) Far defluire l'urina
- c) Gonfiare il palloncino
- d) Tutte le precedenti

**9. Con il termine melena si indica l'emissione di feci:**

- a) Feci Lucide
- b) Feci picee o color catrame
- c) Feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari
- d) Feci con striature di sangue rosso vivo

**10. Indicare quale delle seguenti azioni non fa parte delle fasi del processo di assistenza infermieristica:**

- a) Prescrizione terapia
- b) Accertamento
- c) Pianificazione
- d) Diagnosi infermieristiche

**11. Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile, il paziente presenterà:**

- a) Reazione emolitica
- b) Edema localizzato nella sede d'infusione
- c) Complicanze emorragiche
- d) Nessuna delle precedenti

**12. La conferma dell'arresto cardiaco si ottiene attraverso:**

- a) Il tracciato ECG
- b) Il riscontro di assenza di polso malleolare
- c) Il riscontro della scomparsa di pressione intracardiaca
- d) Il riscontro di mancanza di comunicazione dal paziente

**13. Che cosa s'intende per emiplegia?**

- a) Diminuzione della massa muscolare dovuta ad una riduzione del volume delle fibre muscolari
- b) Paralisi di una metà, destra o sinistra del corpo
- c) Paralisi degli arti superiori ed inferiori
- d) Nessuna delle precedenti

**14. Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:**

- a) Scala Norton
- b) Scala Brass
- c) Scala Conley
- d) Scala Braden

**15. Il protocollo infermieristico ha essenzialmente la funzione di:**

- a) Monitorare parametri vitali dei pazienti
- b) Registrare gli interventi attuati
- c) Valutare i risultati degli esami ematochimici
- d) Uniformare i diversi comportamenti infermieristici

**16. La causa più frequente di shock cardiogeno è:**

- a) Fibrillazione atriale ad alta frequenza
- b) Fibrillazione atriale a bassa frequenza
- c) Infarto miocardico acuto
- d) Edema degli arti inferiori

**17. La nutrizione parenterale è somministrata attraverso:**

- a) Sondino nasogastrico
- b) PEG
- c) Accesso venoso
- d) Nessuna delle precedenti

**18. Durante l'esecuzione della manovra di tracheo aspirazione devono essere monitorati i parametri vitali in quanto vi può essere una stimolazione vagale che determina:**

- a) Ipotensione e tachicardia
- b) Iperglicemia
- c) Iperpiressia
- d) Anisocoria

**19. Per effettuare la procedura di "incannulamento di una vena periferica", quale, tra le seguenti azioni, deve essere compiuta per prima?**

- a) Individuare l'arto sul quale eseguire la venipuntura, posizionarvi sotto un telino e allestire il materiale
- b) Eseguire un lavaggio appropriato delle mani e descrivere al paziente la procedura, facendogli assumere una posizione confortevole che faciliti l'identificazione del sito più idoneo alla venipuntura
- c) Eseguire un'adeguata disinfezione del sito
- d) Registrare la procedura

**20. OPI è l'acronimo di:**

- a) Ordine professioni intellettuali
- b) Organismo professionale infermieristico
- c) Organizzazione professionale infermieristica
- d) Ordine professioni infermieristiche

1. In quale distretto va eseguita la paracentesi?
- a) Torace  
 b) Arti inferiori  
 c) Addome  
 d) Nessuna delle precedenti
2. L'iscrizione all'Ordine per un infermiere è:
- a) Necessaria per esercitare la libera professione  
 b) Indispensabile per essere assunti in strutture pubbliche  
 c) Indispensabile per essere assunti in strutture private  
 d) Tutte le precedenti
3. La raccolta dell'urina all'interno di un contenitore sterile si utilizza per:
- a) Un esame batteriologico  
 b) Ogni qualvolta si deve fare un esame completo delle urine  
 c) Per fare un sedimento delle urine  
 d) Tutti e tre i motivi sopra descritti
4. Lo pneumotorace spontaneo è costituito da presenza di:
- a) Pus nella cavità pleurica  
 b) Liquidi nelle cavità alveolari  
 c) Aria nella cavità mediastinica  
 d) Aria nella cavità pleurica
5. Il paziente si definisce bradicardico quando:
- a) La frequenza cardiaca è < 60 bpm  
 b) La pressione arteriosa sistolica è < 90 mmHg  
 c) La diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml  
 d) Il polso si presenta aritmico
6. La Disfagia determina:
- a) Avversione per i cibi solidi  
 b) Dolore post prandiale  
 c) Difficoltà alla deglutizione  
 d) Assunzioni di quantità eccessiva di liquid
7. Si definisce ritenzione urinaria:
- a) Bruciore durante la minzione  
 b) Produzione di urina < 200 ml nelle 24 ore  
 c) Produzione di urina > 400 ml nelle 24 ore  
 d) Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica
8. Dopo aver inserito un catetere di Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione:
- a) Iniettare della soluzione fisiologica  
 b) Far defluire l'urina  
 c) Gonfiare il palloncino  
 d) Tutte le precedenti
9. Con il termine melena si indica l'emissione di feci:
- a) Feci Lucide  
 b) Feci picee o color catrame  
 c) Feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari  
 d) Feci con striature di sangue rosso vivo
10. Indicare quale delle seguenti azioni non fa parte delle fasi del processo di assistenza infermieristica:
- a) Prescrizione terapia  
 b) Accertamento  
 c) Pianificazione  
 d) Diagnosi infermieristiche
11. Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile, il paziente presenterà:
- a) Reazione emolitica  
 b) Edema localizzato nella sede d'infusione  
 c) Complicanze emorragiche  
 d) Nessuna delle precedenti
12. La conferma dell'arresto cardiaco si ottiene attraverso:
- a) Il tracciato ECG  
 b) Il riscontro di assenza di polso malleolare  
 c) Il riscontro della scomparsa di pressione intracardiaca  
 d) Il riscontro di mancanza di comunicazione dal paziente
13. Che cosa s'intende per emiplegia?
- a) Diminuzione della massa muscolare dovuta ad una riduzione del volume delle fibre muscolari  
 b) Paralisi di una metà, destra o sinistra del corpo  
 c) Paralisi degli arti superiori ed inferiori  
 d) Nessuna delle precedenti
14. Fra gli strumenti che hanno mostrato la maggiore utilità nella valutazione del rischio di caduta di un paziente si annovera:
- a) Scala Norton  
 b) Scala Brass  
 c) Scala Conley  
 d) Scala Braden
15. Il protocollo infermieristico ha essenzialmente la funzione di:
- a) Monitorare i parametri vitali dei pazienti  
 b) Registrare gli interventi attuati  
 c) Valutare i risultati degli esami ematochimici  
 d) Uniformare i diversi comportamenti infermieristici
16. La causa più frequente di shock cardiogeno è:
- a) Fibrillazione atriale ad alta frequenza  
 b) Fibrillazione atriale a bassa frequenza  
 c) Infarto miocardico acuto  
 d) Edema degli arti inferiori
17. La nutrizione parenterale è somministrata attraverso:
- a) Sondino nasogastrico  
 b) PEG  
 c) Accesso venoso  
 d) Nessuna delle precedenti
18. Durante l'esecuzione della manovra di tracheo aspirazione devono essere monitorati i parametri vitali in quanto vi può essere una stimolazione vagale che determina:
- a) Ipotensione e tachicardia  
 b) Iperglicemia  
 c) Iperpiressia  
 d) Anisocoria
19. Per effettuare la procedura di "incannulamento di una vena periferica", quale, tra le seguenti azioni, deve essere compiuta per prima?
- a) Individuare l'arto sul quale eseguire la venipuntura, posizionarvi sotto un telino e allestire il materiale  
 b) Eseguire un lavaggio appropriato delle mani e descrivere al paziente la procedura, facendogli assumere una posizione confortevole che faciliti l'identificazione del sito più idoneo alla venipuntura  
 c) Eseguire un'adeguata disinfezione del sito  
 d) Registrare la procedura
20. OPI è l'acronimo di:
- a) Ordine professioni intellettuali  
 b) Organismo professionale infermieristico  
 c) Organizzazione professionale infermieristica  
 d) Ordine professioni infermieristiche

1. La raccolta dell'urina all'interno di un contenitore sterile si utilizza per:

- a) Un esame batteriologico
- b) Ogni qualvolta si deve fare un esame completo delle urine
- c) Per fare un sedimento delle urine
- d) Tutti e tre i motivi sopra descritti

2. Per SCA si intende:

- a) Scompenso Cardiaco Acuto
- b) Sindrome Coronarica Acuta
- c) Scompenso Congestivo Acuto
- d) Sindrome Coronarica dell'Anziano

3. Le misure infermieristiche per prevenire le cadute nei pazienti anziani includono:

- a) Provvedere a una buona illuminazione
- b) Orientare il paziente nell'ambiente
- c) Mettere il letto nella posizione più bassa
- d) Tutte le precedenti

4. La scala di Norton valuta:

- a) Rischio di caduta
- b) Rischio di incontinenza
- c) Rischio di infezione
- d) Rischio di lesione da pressione

5. Si definisce sincope:

- a) Una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza
- b) Un sintomo dell'epilessia
- c) Un sinonimo di ipotermia
- d) Una perdita di coscienza irreversibile

6. In quale distretto va eseguita la paracentesi?

- a) Torace
- b) Arti inferiori
- c) Addome
- d) Nessuna delle precedenti

7. Come si misura la pressione in arteria polmonare?

- a) Con la Sonda di Hegar
- b) Con la Sonda di Sengstaken- Blackmore
- c) Con il Catetere di Swan-Ganz
- d) Con il Catetere di Foley

8. Il paziente si definisce bradicardico quando:

- a) La frequenza cardiaca è < 60 bpm
- b) La pressione arteriosa sistolica è < 90 mmHg
- c) La diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml
- d) Il polso si presenta aritmico

9. Lo pneumotorace spontaneo è costituito da presenza di:

- a) Pus nella cavità pleurica
- b) Liquidi nelle cavità alveolari
- c) Aria nella cavità mediastinica
- d) Aria nella cavità pleurica

10. Quale valutazione faresti per stimare lo stato di idratazione di una persona?

- a) Palpazione dell'addome
- b) Valutazione del turgore cutaneo
- c) Percussione pubica
- d) Palpazione di entrambi i reni

11. In un paziente anziano è importante:

- a) Mobilizzazione frequente
- b) Programma di riabilitazione pianificato sulle necessità del paziente
- c) Frequenti controlli della cute per prevenire lesioni da pressione
- d) Tutte le precedenti

12. Le fiale di KCL devono essere conservate:

- a) Assieme ai farmaci per uso parenterale
- b) Assieme ai farmaci antibiotici
- c) In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco pericoloso"
- d) Non sono necessari particolari accorgimenti

13. Che tipo di raccoglitore è il Bulau?

- a) Raccoglitore a circuito chiuso per urine
- b) Raccoglitore a circuito chiuso per caduta
- c) Raccoglitore a circuito chiuso e/o aperto
- d) Raccoglitore per escreato coltura

14. Che cosa è un codice deontologico?

- a) Un mansionario da consultare per sapere come comportarsi in una data situazione
- b) Un repertorio di comportamenti in cui si devono trovare tutte le risposte
- c) Un insieme di regole e principi adottati da una professione che ne orientano il comportamento
- d) Un elenco di attività richieste al professionista

15. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito:

- a) Sul mitto intermedio
- b) Sul mitto iniziale
- c) Nessuna delle precedenti
- d) È indifferente

16. Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:

- a) Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- b) Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
- c) Diminuire la velocità di infusione continuando la trasfusione poiché tali sintomi sono para-fisiologici
- d) Rilevare i parametri vitali, diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico

17. Nel paziente incosciente in decubito supino la causa principale di ostruzione delle vie aeree è:

- a) Flessione della glottide
- b) Ostruzione della laringe da alimento non digerito
- c) Flessione dell'epiglottide
- d) Caduta della lingua all'indietro

18. Con il termine melena si indica l'emissione di feci:

- a) Feci Lucide
- b) Feci picee o color catrame
- c) Feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari
- d) Feci con striature di sangue rosso vivo

19. OPI è l'acronimo di:

- a) Ordine professioni intellettuali
- b) Organismo professionale infermieristico
- c) Organizzazione professionale infermieristica
- d) Ordine professioni infermieristiche

20. Durante il monitoraggio Holter, il paziente deve:

- a) Mantenere il riposo assoluto
- b) Effettuare uno sforzo eccessivo
- c) Condurre una vita normale
- d) Attenersi ad una dieta leggera

1. La raccolta dell'urina all'interno di un contenitore sterile si utilizza per:
  - a) Un esame batteriologico
  - b) Ogni qualvolta si deve fare un esame completo delle urine
  - c) Per fare un sedimento delle urine
  - d) Tutti e tre i motivi sopra descritti
  
2. Per SCA si intende:
  - a) Scopenso Cardiaco Acuto
  - b) **Sindrome Coronarica Acuta**
  - c) Scopenso Congestizio Acuto
  - d) Sindrome Coronarica dell'Anziano
  
3. Le misure infermieristiche per prevenire le cadute nei pazienti anziani includono:
  - a) Provvedere a una buona illuminazione
  - b) Orientare il paziente nell'ambiente
  - c) Mettere il letto nella posizione più bassa
  - d) **Tutte le precedenti**
  
4. La scala di Norton valuta:
  - a) Rischio di caduta
  - b) Rischio di incontinenza
  - c) Rischio di infezione
  - d) **Rischio di lesione da pressione**
  
5. Si definisce sincope:
  - a) **Una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza**
  - b) Un sintomo dell'epilessia
  - c) Un sinonimo di ipotermia
  - d) Una perdita di coscienza irreversibile
  
6. In quale distretto va eseguita la paracentesi?
  - a) Torace
  - b) Arti inferiori
  - c) **Addome**
  - d) Nessuna delle precedenti
  
7. Come si misura la pressione in arteria polmonare?
  - a) Con la Sonda di Hegar
  - b) Con la Sonda di Sengstaken- Blackmore
  - c) **Con il Catetere di Swan-Ganz**
  - d) Con il Catetere di Foley
  
8. Il paziente si definisce bradicardico quando:
  - a) **La frequenza cardiaca è < 60 bpm**
  - b) La pressione arteriosa sistolica è <90 mmHg
  - c) La diuresi giornaliera è inferiore a 500 ml
  - d) Il polso si presenta aritmico
  
9. Lo pneumotorace spontaneo è costituito da presenza di:
  - a) Pus nella cavità pleurica
  - b) Liquidi nelle cavità alveolari
  - c) Aria nella cavità mediastinica
  - d) **Aria nella cavità pleurica**
  
10. Quale valutazione faresti per stimare lo stato di idratazione di una persona?
  - a) Palpazione dell'addome
  - b) **Valutazione del turgore cutaneo**
  - c) Percussione pubica
  - d) Palpazione di entrambi i reni
  
11. In un paziente anziano è importante:
  - a) Mobilizzazione frequente
  - b) Programma di riabilitazione pianificato sulle necessità del paziente
  - c) Frequenti controlli della cute per prevenire ulcere da decubito
  - d) **Tutte le precedenti**
  
12. Le fiale di KCL devono essere conservate:
  - a) Assieme ai farmaci per uso parenterale
  - b) Assieme ai farmaci antibiotici
  - c) **In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco pericoloso"**
  - d) Non sono necessari particolari accorgimenti
  
13. Che tipo di raccoglitore è il Bulau?
  - a) Raccoglitore a circuito chiuso per urine
  - b) **Raccoglitore a circuito chiuso per caduta**
  - c) Raccoglitore a circuito chiuso e/o aperto
  - d) Raccoglitore per escreato coltura
  
14. Che cosa è un codice deontologico?
  - a) Un mansionario da consultare per sapere come comportarsi in una data situazione
  - b) Un repertorio di comportamenti in cui si devono trovare tutte le risposte
  - c) **Un insieme di regole e principi adottati da una professione che ne orientano il comportamento**
  - d) Un elenco di attività richieste al professionista
  
15. Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito:
  - a) **Sul mitto intermedio**
  - b) Sul mitto iniziale
  - c) Nessuna delle precedenti
  - d) È indifferente
  
16. Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:
  - a) Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
  - b) **Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico**
  - c) Diminuire la velocità di infusione continuando la trasfusione poiché tali sintomi sono parafisiologici
  - d) Rilevare i parametri vitali, diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
  
17. Nel paziente incosciente in decubito supino la causa principale di ostruzione delle vie aeree è:
  - a) Flessione della glottide
  - b) Ostruzione della laringe da alimento non digerito
  - c) Flessione dell'epiglottide
  - d) **Caduta della lingua all'indietro**
  
18. Con il termine melena si indica l'emissione di feci:
  - a) Feci Lucide
  - b) **Feci color pece o catrame**
  - c) Feci di colore chiaro per carenza di pigmenti biliari
  - d) Feci con striature di sangue rosso vivo
  
19. OPI è l'acronimo di:
  - a) Ordine professioni intellettuali
  - b) Organismo professionale infermieristico
  - c) Organizzazione professionale infermieristica
  - d) **Ordine professioni infermieristiche**
  
20. Durante il monitoraggio Holter, il paziente deve:
  - a) Mantenere il riposo assoluto
  - b) Effettuare uno sforzo eccessivo
  - c) **Condurre una vita normale**
  - d) Attenersi ad una dieta leggera

1. Le misure infermieristiche per prevenire le cadute nei pazienti anziani includono:

- a) Provvedere a una buona illuminazione
- b) Orientare il paziente nell'ambiente
- c) Mettere il letto nella posizione più bassa
- d) Tutte le precedenti

2. Per SCA si intende:

- a) Scoppio Cardiac Acuto
- b) Sindrome Coronarica Acuta
- c) Scoppio Congestivo Acuto
- d) Sindrome Coronarica dell'Anziano

3. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica?

- a) Pancreatite
- b) Sindrome nefrosica
- c) Encefalite
- d) Gastroenterite

4. Durante il monitoraggio Holter, il paziente deve:

- a) Mantenere il riposo assoluto
- b) Effettuare uno sforzo eccessivo
- c) Condurre una vita normale
- d) Attenersi ad una dieta leggera

5. L'iscrizione all'Ordine per un infermiere è:

- a) Necessaria per esercitare la libera professione
- b) Indispensabile per essere assunti in strutture pubbliche
- c) Indispensabile per essere assunti in strutture private
- d) Tutte le precedenti

6. La Disfagia determina:

- a) Avversione per i cibi solidi
- b) Dolore post prandiale
- c) Difficoltà alla deglutizione
- d) Assunzioni di quantità eccessiva di liquidi

7. Per effettuare la procedura di "incannulamento di una vena periferica", quale, tra le seguenti azioni, deve essere compiuta per prima?

- a) Individuare l'arto sul quale eseguire la venipuntura, posizionarvi sotto un telino e allestire il materiale
- b) Eseguire un lavaggio appropriato delle mani e descrivere al paziente la procedura, facendogli assumere una posizione confortevole che faciliti l'identificazione del sito più idoneo alla venipuntura
- c) Eseguire un'adeguata disinfezione del sito
- d) Registrare la procedura

8. Con il processo di sterilizzazione si ottiene:

- a) L'eliminazione totale di tutti i microrganismi patogeni sia nella forma vegetativa che sotto forma di spore.
- b) La sola riduzione di microrganismi patogeni
- c) La eliminazione dei funghi
- d) Nessuna delle precedenti

9. Cosa si intende per escara?

- a) Una lesione da grattamento
- b) Più vescicole piene di liquido poste tra epidermide e derma
- c) Una gangrena umida, espressione di necrosi dell'epidermide
- d) Una gangrena superficiale chiusa e secca, espressione di necrosi dell'epidermide e degli strati superficiali del derma, adesa agli strati profondi

10. Quali tra queste sono le infezioni ospedaliere maggiormente riscontrate nei nosocomi italiani?

- a) Otiti
- b) Meningiti
- c) Endoftalmi
- d) Infezioni del tratto urinario

11. Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile, il paziente presenterà:

- a) Reazione emolitica
- b) Edema localizzato nella sede d'infusione
- c) Complicanze emorragiche
- d) Nessuna delle precedenti

12. Che cosa s'intende per emiplegia?

- a) Diminuzione della massa muscolare dovuta ad una riduzione del volume delle fibre muscolari
- b) Paralisi di una metà, destra o sinistra del corpo
- c) Paralisi degli arti superiori ed inferiori
- d) Nessuna delle precedenti

13. In un paziente iperteso con epistassi l'infermiere si preoccupa di garantire una posizione:

- a) Capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso
- b) Capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda
- c) Capo chino in avanti posizionando sotto il mento una arcella per valutare l'entità della perdita ematica
- d) Posizionare il paziente disteso supino in posizione di Trendelenburg

14. Dopo aver inserito un catetere di Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione:

- a) Iniettare della soluzione fisiologica
- b) Far defluire l'urina
- c) Gonfiare il palloncino
- d) Tutte le precedenti

15. In un paziente anziano è importante:

- a) Mobilitazione frequente
- b) Programma di riabilitazione pianificato sulle necessità del paziente
- c) Frequenti controlli della cute per prevenire lesioni da pressione
- d) Tutte le precedenti

16. Cos'è l'emofteo?

- a) Emissione dalla bocca di vomito, proveniente dall'apparato digerente
- b) Emissione dalla bocca di catarro
- c) Emissione dalla bocca di espettorato misto a sangue, proveniente dalle vie respiratorie
- d) Emissione dalla bocca di ipersecrezione salivare

17. La scala di Brass è utilizzata per:

- a) Identificare lo stato nutrizionale dei pazienti
- b) Identificare i pazienti a rischio di ospedalizzazione prolungata o di dimissione difficili
- c) Identificare i pazienti a rischio di cadute
- d) Identificare lo stato neurologico dei pazienti

18. L'insulina sottocutanea va evitata in caso di:

- a) Insufficienza epatica
- b) Insufficienza renale
- c) Aree cutanee ustionate
- d) Insufficienza cardiaca

19. Il trattamento dialitico può essere effettuato utilizzando:

- a) Fistola artero-venosa
- b) Catetere venoso centrale
- c) Catetere peritoneale
- d) Tutte le precedenti

20. Secondo Lynda Jull Carpenito gli infermieri hanno la responsabilità di trattare:

- a) Diagnosi mediche
- b) Diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi
- c) Interventi clinici e diagnostici secondo prescrizione medica
- d) Interventi di infermieristica pediatrica

1. Le misure infermieristiche per prevenire le cadute nei pazienti anziani includono:

- a) Provvedere a una buona illuminazione
- b) Orientare il paziente nell'ambiente
- c) Mettere il letto nella posizione più bassa
- d) Tutte le precedenti

2. Per SCA si intende:

- a) Scopenso Cardiaco Acuto
- b) **Sindrome Coronarica Acuta**
- c) Scopenso Congestivo Acuto
- d) Sindrome Coronarica dell'Anziano

3. Quale tra queste patologie rappresenta la prima causa di disidratazione in età pediatrica?

- a) Pancreatite
- b) Sindrome nefrosica
- c) Encefalite
- d) **Gastroenterite**

4. Durante il monitoraggio Holter, il paziente deve:

- a) Mantenere il riposo assoluto
- b) Effettuare uno sforzo eccessivo
- c) **Condurre una vita normale**
- d) Attenersi ad una dieta leggera

5. L'iscrizione all'Ordine per un infermiere è:

- a) Necessaria per esercitare la libera professione
- b) Indispensabile per essere assunti in strutture pubbliche
- c) Indispensabile per essere assunti in strutture private
- d) **Tutte le precedenti**

6. La Disfagia determina:

- a) Avversione per i cibi solidi
- b) Dolore post prandiale
- c) **Difficoltà alla deglutizione**
- d) Assunzioni di quantità eccessiva di liquidi

7. Per effettuare la procedura di "incannulamento di una vena periferica", quale, tra le seguenti azioni, deve essere compiuta per prima?

- a) Individuare l'arto sul quale eseguire la venipuntura, posizionarvi sotto un telino e allestire il materiale
- b) **Eeguire un lavaggio appropriato delle mani e descrivere al paziente la procedura, facendogli assumere una posizione confortevole che faciliti l'identificazione del sito più idoneo alla venipuntura**
- c) Eseguire un'appropriate disinfezione del sito
- d) Registrare la procedura

8. Con il processo di sterilizzazione si ottiene:

- a) **L'eliminazione totale di tutti i microrganismi patogeni sia nella forma vegetativa che sotto forma di spore.**
- b) La sola riduzione di microrganismi patogeni
- c) La sola uccisione dei funghi
- d) Nessuna delle precedenti

9. Cosa si intende per escara?

- a) Una lesione da grattamento
- b) Più vescicole piene di liquido poste tra epidermide e derma
- c) Una gangrena umida, espressione di necrosi dell'epidermide
- d) **Una gangrena superficiale chiusa e secca, espressione di necrosi dell'epidermide e degli strati superficiali del derma, adesa agli strati profondi**

10. Quali tra queste sono le infezioni ospedaliere maggiormente riscontrate nei nosocomi italiani?

- a) Otitis
- b) Meningiti
- c) Endoftalmiti
- d) **Infezioni del tratto urinario**

11. Se si effettua una trasfusione di sangue incompatibile, il paziente presenterà:

- a) **Reazione emolitica**
- b) Edema localizzato nella sede d'infusione
- c) Complicanze emorragiche
- d) Nessuna delle precedenti

12. Che cosa s'intende per emiplegia?

- a) Diminuzione della massa muscolare dovuta ad una riduzione del volume delle fibre muscolari
- b) **Paralisi di una metà, destra o sinistra del corpo**
- c) Paralisi degli arti superiori ed inferiori
- d) Nessuna delle precedenti

13. In un paziente iperteso con epistassi l'infermiere si preoccupa di garantire una posizione:

- a) Capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso
- b) Capo flesso all'indietro tamponando con garze il naso e posizionando sulla fronte una garza bagnata fredda
- c) **Capo chino in avanti posizionando sotto il mento una arcella per valutare l'entità della perdita ematica**
- d) Posizionare il paziente disteso supino in posizione di Trendelenburg

14. Dopo aver inserito un catetere di Foley, cosa bisogna fare per accertarsi dell'esatta posizione:

- a) Iniettare della soluzione fisiologica
- b) Far defluire l'urina
- c) Gonfiare il palloncino
- d) **Tutte le precedenti**

15. In un paziente anziano è importante:

- a) Mobilitazione frequente
- b) Programma di riabilitazione pianificato sulle necessità del paziente
- c) Frequenti controlli della cute per prevenire ulcere da decubito
- d) **Tutte le precedenti**

16. Cos'è l'emoftoe?

- a) Emissione dalla bocca di vomito, proveniente dall'apparato digerente
- b) Emissione dalla bocca di catarro
- c) **Emissione dalla bocca di espettorato misto a sangue, proveniente dalle vie respiratorie**
- d) Emissione dalla bocca di ipersecrezione salivare

17. La scala di Brass è utilizzata per:

- a) Identificare lo stato nutrizionale dei pazienti
- b) **Identificare i pazienti a rischio di ospedalizzazione prolungata o di dimissione difficili**
- c) Identificare i pazienti a rischio di cadute
- d) Identificare lo stato neurologico dei pazienti

18. L'insulina sottocutanea va evitata in caso di:

- a) Insufficienza epatica
- b) Insufficienza renale
- c) **Aree cutanee ustionate**
- d) Insufficienza cardiaca

19. Il trattamento dialitico può essere effettuato utilizzando:

- a) Fistola artero-venosa
- b) Catetere venoso centrale
- c) Catetere peritoneale
- d) **Tutte le precedenti**

20. Secondo Lynda Juall Carpenito gli infermieri hanno la responsabilità di trattare:

- a) Diagnosi mediche
- b) **Diagnosi infermieristiche e problemi collaborativi**
- c) Interventi clinici e diagnostici secondo prescrizione medica
- d) Interventi di infermieristica pediatrica