

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Dipartimento Materno-Infantile
Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia
Direttore Prof. Tullio Ghi

COVID-19 e gravidanza: informazioni utili per le pazienti

Quali effetti può avere il coronavirus sulle donne in gravidanza?

Non sembra che le gestanti siano maggiormente suscettibili alle complicanze legate all'infezione rispetto alla popolazione generale. Pare che la grande maggioranza delle gestanti presenti solamente un raffreddore e/o una febbre di entità da lieve a moderata.

Le donne in gravidanza, in generale, sono più vulnerabili a contrarre infezioni virali rispetto alla popolazione femminile generale. Le pazienti affette da comorbidità respiratorie (come l'asma) sono inclini a manifestare sintomi più gravi in caso di infezione.

Manifestazioni più severe, come la polmonite interstiziale, risultano essere più frequenti in persone di età più avanzata, immunodepresse o con patologie croniche (diabete, ipertensione, sindrome metabolica).

Quali effetti può avere il coronavirus sul mio bambino in caso di infezione?

Non è stato riportato un aumentato rischio di aborto nelle pazienti infette. Non vi sono evidenze che l'infezione possa associarsi a quadri malformativi.

Nelle gravidanze delle donne con infezione da SARS-CoV-2 sembra esservi un lieve aumento del rischio di parto pretermine e restrizione dell'accrescimento fetale.

Il tasso di trasmissione verticale materno-fetale è estremamente basso.


Cosa posso fare per ridurre il rischio di contrarre l'infezione?

La cosa più importante da fare è il regolare e frequente lavaggio sociale delle mani, soprattutto al momento del rientro a domicilio o sul posto di lavoro dopo essere stati in luoghi pubblici. Ad oggi si raccomanda di far fede alle indicazioni ministeriali per la prevenzione della diffusione dell'infezione da coronavirus: vedi ordinanza del Ministero della Salute "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" e le faq del Governo sul decreto "#Iorestoacasa", disponibili sul sito <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>.

Cosa devo fare nel caso in cui abbia il sospetto di aver contratto l'infezione o abbia avuto contatti con soggetti positivi?

In caso di febbre superiore a 37,5°C e/o sintomi respiratori (tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria), si raccomanda di contattare in prima istanza il proprio medico di base. In presenza di sintomi da moderati a severi contattare il Servizio di Emergenza Territoriale 118, che valuterà se eseguire il tampone naso-faringeo o inviare la gravida in Ospedale.

In questo momento in Ospedale, all'ingresso del Padiglione Maternità, è attivo un pre-triage atto alla rilevazione dei parametri di tutti gli utenti che accedono al padiglione, al fine di screenare le pazienti potenzialmente sintomatiche e adottare conseguentemente le necessarie misure di isolamento e protezione nei casi sospetti.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Dipartimento Materno-Infantile
Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia
Direttore Prof. Tullio Ghi

Mi verrà fatto un tampone per coronavirus?

Il percorso diagnostico per l'infezione da coronavirus è in continua evoluzione. Al momento, l'esecuzione del tampone a domicilio, viene decisa caso per caso dal Medico Competente e organizzata dall'Istituto di Igiene.

Cosa devo fare nel caso in cui risultassi positiva al tampone?

In caso di positività al tampone naso-faringeo, si raccomanda innanzitutto di comunicare il risultato al proprio ginecologo e/o al Consultorio di riferimento, nonché alla nostra UO al numero 0521 702431 (Accettazione Ostetrico-Ginecologica, AOU di Parma) al fine di informare della diagnosi il personale coinvolto nell'assistenza.

In caso di sintomi lievi o molto modesti, verrà indicato di rimanere in quarantena domiciliare.

In caso di sintomi da moderati a severi potrebbe rendersi necessario un ricovero ospedaliero (vedi sopra). In caso di attività contrattile, perdite genitali e/o altre problematiche urgenti relative alla gravidanza, si raccomanda l'accesso al pre-triage dell'Accettazione Ostetrico-Ginecologica.

E' raccomandato l'utilizzo della mascherina chirurgica al fine di ridurre il rischio di contagio.

Cosa posso fare nel caso in cui venisse indicata la quarantena domiciliare?

I pazienti a cui viene indicata la quarantena domiciliare devono rimanere all'interno del proprio domicilio ed evitare contatti con altre persone. È raccomandabile aerare le stanze di permanenza aprendo le finestre per almeno mezz'ora al giorno. Cercare per quanto possibile di rimanere separati dagli altri membri del nucleo familiare, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro, utilizzando asciugamani, stoviglie e posate dedicati per i pasti. Le norme igieniche da rispettare in caso di quarantena domiciliare sono riportate nel documento allegato dell'Istituto Superiore di Sanità (vedi documento allegato "Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono).

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanzaparto-allattamento>


Posso recarmi agli appuntamenti per il controllo della gravidanza se sono in quarantena?

È possibile che gli appuntamenti per il controllo della gravidanza (ecografie e controlli ostetrici di routine) o la presa in carico vengano dilazionati al termine del periodo di quarantena se non urgenti. In caso di accessi che non possano essere dilazionati oltre i termini temporali previsti, sarà necessario organizzare la valutazione con tutte le precauzioni e gli accorgimenti del caso (ad esempio l'appuntamento potrebbe essere spostato di giorno, orario, sede di accesso per ridurre il rischio di contagio).

Come verrà seguita la mia gravidanza dopo la guarigione?

In via precauzionale, verrà eseguito un controllo ostetrico a 14 giorni dalla guarigione. In caso di negativizzazione del tampone naso-faringeo prima dell'insorgenza del travaglio, la gestione del travaglio e del parto non subirà alcuna variazione rispetto alla condotta standard.

Cosa devo fare nel caso in cui mi sentissi male o fossi preoccupata per il mio bambino mentre sono in quarantena?



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

Dipartimento Materno-Infantile
Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia
Direttore Prof. Tullio Ghi

Si raccomanda di ricorrere ad accesso c/o Accettazione Ostetrico-Ginecologica solo ed esclusivamente in caso di reale urgenza e necessità. In caso di dubbi o preoccupazioni inerenti il decorso della gravidanza è possibile contattare telefonicamente l'Accettazione Ostetrico-Ginecologica (tel. 0521 702431) in modo da confrontarsi con il personale ostetrico al fine di valutare la necessità di una valutazione in urgenza.

In caso di Accesso c/o Accettazione Ostetrico-Ginecologica, si raccomanda di allertare telefonicamente la stessa del proprio arrivo; utilizzare la mascherina, da indossare prima di uscire dal proprio domicilio; utilizzare preferenzialmente un mezzo di trasporto privato adottando tutte le precauzioni del caso al fine di proteggere anche gli eventuali accompagnatori.

Che misure verranno prese al momento del ricovero quando entrerà in travaglio?

In pazienti con infezione sospetta o accertata in condizioni cliniche non critiche non sussiste l'indicazione all'espletamento del parto mediante taglio cesareo elettivo.

Il travaglio verrà quindi monitorato mediante cardiocografia in continuo e rilevazione periodica dei parametri materni (MEOWS) all'interno di un'area dedicata, appositamente individuata all'interno del Padiglione, all'interno della quale verranno adottate tutte le precauzioni e le misure atte alla prevenzione del contagio di pazienti e operatori sanitari.

In caso di necessità di esecuzione di taglio cesareo urgente per peggioramento critico delle condizioni materne o per motivi ostetrici legati al decorso del travaglio, l'intervento verrà eseguito in una sala operatoria dedicata.

La puerpera in condizioni non critiche verrà poi trasferita al 2° piano del Padiglione Maternità in apposita stanza di isolamento e dimessa non appena possibile.

Posso trasmettere il coronavirus al mio bambino?

Non sono ancora stati riportati casi di trasmissione in utero in donne che hanno contratto l'infezione durante il terzo trimestre di gravidanza.

Sulla base della condizione clinica della mamma il neonato potrà essere temporaneamente separato dalla mamma e portato in osservazione in Neonatologia ove verrà valutato dai medici neonatologi.

Tutti i neonati di madri infette verranno testati tramite tampone naso-faringeo per coronavirus dopo la nascita.

Potrò allattare il mio bambino?

L'allattamento al seno, in un'ottica di bilancio rischi-benefici, viene incoraggiato, con l'utilizzo di mascherina FFP2 e previa corretta igienizzazione delle mani.